

## Термическое уравнение состояния

### Понятия

- Термическое уравнение состояния,  $f(T, p, V, n) = 0$
- Термические коэффициенты
  - ⇒ Коэффициент объемного расширения,  $\alpha_V = (1/V)(\partial V/\partial T)_p$
  - ⇒ Изотермический коэффициент сжатия,  $\kappa_T = -(1/V)(\partial V/\partial p)_T$
  - ⇒ Относительный коэффициент давления,  $\alpha_p = (1/p)(\partial p/\partial T)_V$
- Идеальный газ
- Реальный газ
- Мольный объем,  $V_m = V/n$
- Парциальный мольный объем,  $V' = (\partial V/\partial n)_{Tp}$

### Уравнения

- Уравнение состояния идеального газа,  $PV = nRT$
- Уравнение состояния жидкости и твердого тела,  $V \approx const$
- Уравнение состояния Ван-дер-Ваальса,  $(p + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$
- Вириальное уравнение состояния,  $pV/(nRT) = (1 + nB(T)/V + n^2C(T)/V^2 + \dots)$
- Соотношения между частными производными
  - ⇒ инвертер,  $(\partial y/\partial x)_z = 1/(\partial x/\partial y)_z$
  - ⇒ пермутер,  $(\partial x/\partial y)_z(\partial y/\partial z)_x(\partial z/\partial x)_y = -1$
  - ⇒ Дифференцирование сложных функций. Если  $z = f(x, y)$ , а  $x = g(u, v)$  и  $y = h(u, v)$ , то тогда  $(\partial z/\partial u)_v = (\partial z/\partial x)_y(\partial x/\partial u)_v + (\partial z/\partial y)_x(\partial y/\partial u)_v$  и  $(\partial z/\partial v)_u = (\partial z/\partial x)_y(\partial x/\partial v)_u + (\partial z/\partial y)_x(\partial y/\partial v)_u$
  - ⇒ Дифференцирование неявной функции, если  $F(x, y, z) = 0$ , то  $(\partial z/\partial x)_y = -F'_x(x, y, z)/F'_z(x, y, z)$
- Условие полного дифференциала, если  $z = f(x, y)$ , то  $dz = f_1(x, y)dx + f_2(x, y)dy$  и при этом  $(\partial f_1/\partial y)_x = (\partial f_2/\partial x)_y$
- Связь мольного объема и парциального мольного объема для чистого вещества,  $V_m = V'$ .

### Проблемы

#### Расчеты по уравнению состояния

1. Некоторый газ имел плотность 1.512 г/л при температуре 300 К и давлении 0.4 атм. Определите молекулярный вес газа, считая, что его поведение подчиняется уравнению состояния идеального газа. (93 г/моль)

2. Рассчитайте давление, оказываемое 1 молем этилена, ведущего себя как газ Ван-дер-Ваальса, если он находится при следующих условиях 1) при 273.15 К в 22.414 л, 2) при 1000 К в 100 см<sup>3</sup>. Константы в уравнении Ван-дер-Ваальса  $a = 4.471 \text{ л}^2\text{атм/моль}^2$ ,  $b = 0.05714 \text{ л/моль}$ . (0.994 атм и 1467 атм)

Подсказка. Задачи на непосредственное использование уравнения состояния идеального газа и газа Ван-дер-Ваальса. Ошибки обычно связаны с размерностью.

### Нахождение одного термического коэффициента через другие.

3. Для меди даны коэффициент объемного расширения,  $\alpha_V = 0.5 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$  и изотермический коэффициент сжатия,  $\kappa_T = 0.7 \cdot 10^{-6} \text{ атм}^{-1}$ . Определите из этих данных относительный коэффициент давления,  $\alpha_p$  при одной атмосфере.

Подсказка. Используйте пермутер. Начните с того, что выпишите определения термических коэффициентов.

### Определение термических коэффициентов из уравнения состояния (производная неявной функции).

4. Рассчитайте коэффициенты объемного расширения  $\alpha_V$  и изотермического сжатия  $\kappa_T$  при 298 К и 1 л для газа Ван-дер-Ваальса (коэффициенты а и b взять из задачи 2). ( $0.0037 \text{ K}^{-1}$ ,  $1.01 \text{ атм}^{-1}$ )

Подсказка. Для газа Ван-дер-Ваальса нельзя взять необходимые производные непосредственно. Выход – использовать дифференцирование неявной функции.

### Построение уравнения состояния из термических коэффициентов (интегрирование полного дифференциала).

5. В ряде экспериментов с некоторым твердым телом установлено, что объемный коэффициент расширения можно аппроксимировать выражением  $\alpha_V = 0.5 \cdot 10^{-3} + 1.07 \cdot 10^{-7} T + 2.08 \cdot 10^{-8} p + 3.51 \cdot 10^{-9} T p$ , а изотермический коэффициент сжимаемости как  $\kappa_T = 0.2 \cdot 10^{-6} + 2 \cdot 10^{-9} p - 1.93 \cdot 10^{-8} T - 3.3 \cdot 10^{-9} T p$ . Покажите, что эти экспериментальные результаты взаимно противоречивы.

Подсказка. Используйте условие полного дифференциала для  $\ln V$ .

6. Некоторое твердое тело имеет термические коэффициенты равные  $\alpha_V = (a + cp)/V$  и  $\kappa_T = (b - cT)/V$ , где а, b, с - константы. Вывести уравнение состояния данного тела. ( $V = V_0 + aT - bp + cpT$ )

7. Для некоторого газа известны выражения для изобарического коэффициента расширения и изотермического коэффициента сжимаемости:  $\alpha_V = R/(pV)$ ,  $\kappa_T = RT/(p^2V)$ . Какому уравнению состояния подчиняется этот газ?

Подсказка. Вспомните правило интегрирования полного дифференциала функции двух переменных. Обратите внимание, что если  $dz = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ , то  $\int dz \neq \int P(x, y) dx + \int Q(x, y) dy$

### Парциальный мольный объем

8. Убедитесь, что для газа Ван-дер-Ваальса мольный объем равен парциальному мольному объему.

Подсказка. Начните с доказательства в общем виде.